



VERENIGING
WEIDVOGELBESCHERMING
STAPHORSTERVELD E.O.

© VERENIGING

WEIDVOGELBESCHERMING STAPHORSTERVELD E.O.

Resultaten en analyse weidevogelseizoen Staphorsterveld e.o. 2025

Het zoekgebied van de vereniging Weidevogelbescherming Staphorsterveld e.o. bevindt zich tussen Hasselt - Lichtmis - Rouveen - Staphorst - Meppel – Zwartsluis (zie kaartje hiernaast) en is ongeveer 8.200 ha groot. In het gebied is een provinciaal weidevogelbeheergebied open grasland van 4.700 ha aangewezen, waarin een kerngebied van 1.200 ha. met als kritische doelsoorten wulp, grutto en tureluur. Het Staphorsterveld wordt gekenmerkt door een slagenlandschap met langgerekte percelen, met diverse smalle en brede sloten. De bodem bestaat uit een tot 2,5 meter dik veenpakket en is nog steeds één van de grootste bolwerken van de wulp in Noordwest-Europa. In het Staphorsterveld ligt het 795 grote natura 2000 gebied de Olde Maten en de Veerslootlanden dat grotendeels in eigendom is van Staatsbosbeheer, met daarin een 250 ha groot weidevogelreservaat (150 ha ingericht voor weidevogels en 100 ha blauwgraslanden met een bloemrijke open vegetatie).



Locaties gevonden nesten in 2025

Op onderstaande kaarten zijn de locaties weergegeven van de gevonden nesten van grutto, Kievit, scholekster, tureluur en wulp.


Grutto



Kievit




Scholekster



Tureluur



Wulp



Secretariaat:
Oude Rijksweg 381
7954GG Rouveen

Bank NL98TRIO0391113720
KvK 64823458
vwbs@wvbstaphorsterveld.com
www.wvbstaphorsterveld.com

Aantal gevonden nesten (met één of meer eieren)

In 2025 zijn 768 weidevogelnesten (met eieren) gevonden. In tabel 1 het aantal gevonden nesten van de diverse vogels van de afgelopen 5 jaren. In grafiek 1 het relatief aantal nesten van de 5 belangrijkste weidevogels uit dezelfde periode. Daarnaast is in 2025 nog een nest van een patrijs gevonden dat uitgekomen is.

Tabel 1:


Jaar	Grutto	Kievit	Schol- ekster	Tureluu- r	Wulp	Wilde- eend	Slobee- nd	Krak- eend	Eend- onbekend	Gras- pieper	Gele- kwiekst.	Water- snip	Kleine plevier	Aantal nesten
2021	32	273	33	23	83	9	6	1		1			1	462
2022	30	291	34	31	70	9	2		1		1			469
2023	44	266	29	30	62	8	3	2				1		445
2024	34	440	19	26	74	23	7	1	1				1	626
2025	74	540	32	34	73	13	1				1			768

Uit tabel 1 en grafiek 1 blijkt dat in 2025 t.o.v. 2024:

- Het aantal gevonden gruttonesten meer dan is verdubbeld

Grafiek 1:

Het relatief aantal gevonden nesten in 2020-2024



(117,6%).

- Het aantal gevonden kievitsnesten met 100 (22,7%) is toegenomen.
- Het aantal gevonden scholeksternesten met een derde (68,4%) is toegenomen.
- Het aantal gevonden tureluurnesten met 8 (30,7%) is toegenomen.
- Het aantal gevonden wulpennesten met 1 (-1,3%) is afgenomen.

Er valt weinig te zeggen over de gevonden nesten van de overige vogels uit tabel 1 vanwege de lage aantallen gevonden nesten en vanwege het feit dat niet speciaal naar die nesten wordt gezocht. Deze nesten worden verder buiten beschouwing gelaten.

Statistiek invoermethode legfels

Een gevonden legsel kan ingevoerd worden via de telefoon of later thuis via de computer/ laptop. Wanneer een legsel is gevonden met de drone en later ingevoerd door de zoekers, dan wordt dat aangegeven als drone. Zie tabel 2

Tabel 2: Invoermethode

	2025		2024		2023		2022	
Invoer methode	Aantal nesten	Percentage	Aantal nesten	Percentage	Aantal nesten	Percentage	Aantal nesten	Percentage
Mobiel/ pc	472	61,2	497	79,1	419	94,2	469	100



Drone	299*	38,8	131	20,8	26	5,8	0	0
Aantal nesten	771		628		445		469	

* Dat is meer dan de 216 vermeld in BLVM, omdat een aantal zoekers ter plekke een nieuw legsel aanmaakten i.p.v. dat het drone legsel werd overgenomen.

Uit tabel 2 blijkt dat in 2025, 38,8% van de gevonden nesten is gevonden met behulp van de drone, dat is een stijging van 53% t.o.v. het jaar 2024.

Aantal gevonden nesten per bedrijf

De bedrijven waar gezocht wordt verschillen in grootte die varieert tussen 1 en meer dan 40 had. In tabel 3 staan het aantal gevonden nesten per bedrijf (nesten) versus het aantal bedrijven. Uit de tabel blijkt dat op 58 bedrijven 1-5 nesten zijn gevonden en dat op 2 bedrijven 46-50 nesten gevonden zijn. (Bedrijf Courtz met 50 nesten en bedrijf Vlastuin (voorheen v.d. Brandhof) met 49 nesten).

Tabel 3: Aantal gevonden nesten versus aantal bedrijven

Aantal									
Nesten	Bedrijven	Nesten	Bedrijven	Nesten	Bedrijven	Nesten	Bedrijven	Nesten	Bedrijven
1-5	58	11-15	5	21-25	6	31-35	2	41-45	
6-10	17	16-20	2	26-30	3	36-40		46-50	2

De resultaten van de gevonden nesten met bekend resultaat.

Er kan van alles met een nest gebeuren, nadat het gevonden is. Veel nesten gaan verloren als gevolg van predatie (rood). Ook kan het voorkomen dat een nest verloren gaat als gevolg van landwerkzaamheden (paars) of door een onbekende oorzaak (lila) of dat een nest verlaten wordt (bruin). Daarnaast komt het voor dat een gevonden nest niet kan worden teruggevonden, dit laatste komt nogal eens voor bij kievits- en tureluurnesten. Op onderstaande kaarten staan de locaties van de nesten vermeld met hun bevindingen. Voor de aantallen zie tabel 5.


Uit

predatie

niet uit werkzaamheden

niet uit onbekend

verlaten





In tabel 4 zijn de resultaten van de gevonden nesten weergegeven. In grafiek 2 de percentages uitgekomen nesten.

Tabel 4: Resultaten gevonden nesten met bekend resultaat.

Soort	Nesten								
	Bekend resultaat ¹⁾	Uit	% uit	Gepredeert	% predatie	Verlaten	Werkzaamheden / beweiding	Onbekend ²⁾	Overig
Grutto	74 (100%)	48	64,9	17	23,0	3	4	2	
Kievit	538 (98,9%)	312	58,0	111	20,8	18	26	65	6
Scholekster	32(100%)	15	46,8	14	45,2	0	1	2	
Tureluur	34 (100%)	30	88,2	1	2,9	0	0	3	
Wulp	73 (100%)	53	72,6	12	16,4	3	1	4	
Totaal	751 (99,7)	458	61,0%	155	20,6%	24 (3,2%)	32(4,3%)	76(10,1%)	6 (0,8)

¹⁾ dit zijn de nesten die na het vinden minimaal 1x zijn gecontroleerd. () het % van de gevonden nesten.


²⁾ Deze nesten zijn wel gecontroleerd. Bij de controle was het niet duidelijk wat er van het legsel is geworden.

Uit de tabel 4 blijkt dat het gemiddelde percentage

- Uitgekomen nesten 61,0 % bedraagt, dat is 6,8% hoger dan het vorige jaar (dat bedroeg toen 54,2%).
- Uitgekomen gruttonesten is dit jaar 64,9% en dat is duidelijk lager dan het vorige jaar (81,8%).
- Uitgekomen nesten van de kievit met 58%, van de scholekster met 46,8% en wulp met 72,6% beter zijn dan het vorige jaar. Toen waren de uitkomstpercentages respectievelijk 51,8%, 26,3% en 52,1%.
- Uitgekomen nesten van de tureluur met 88,2% ongeveer gelijk is dan die van het vorige jaar (87,0%)
- Gepredeerde nesten dit jaar 20,6% bedraagt en aanzienlijk lager is dan in het vorige jaar (35,1%).
- Gepredeerde nesten van de scholekster met 45,2% het hoogste (vorige jaar 58,0%) en dat van de tureluur met 2,9% (vorige jaar 8,7%) het laagste is.

Verder blijkt dat 24 nesten (3,2%) zijn verlaten en 7 nesten (4,3%) verloren zijn gegaan o.g.v. werkzaamheden of beweiding. Deze percentages zijn vergelijkbaar met die van het vorige jaar. Van 82 nesten (11,0%) is het resultaat niet bekend Vorige jaar bedroeg dit percentage 6,1%.

Grafiek 2: uitkomstpercentage nesten in de periode 2021 – 2025




Uit grafiek 2 blijkt dat het uitkomst% van de tureluur het hoogst is, gevolgd door die van de wulp. De uitkomst% van de scholekster is dit jaar opnieuw het laagst.



Tijdstip van het vinden van een nest

Op 17 maart werd het eerste nest gevonden, een Kievitsnest en het laatste nest, een scholeksternest, Op 30 juni (zie tabel 5).

Grafiek 3: aantal gevonden nesten per week.



In grafiek 3 de verdeling van de nesten over de weken.

Tabel 5: gevonden 1^e en laatste nest

	1 ^e nest	Laatste nest
Grutto	9 april	6 juni
Kievit	17 maart	11 juni
Scholekster	17 april	30 juni
Tureluur	14 april	4 juni
Wulp	18 maart	3 juni

Uit grafiek 3 blijkt dat de meeste nesten worden gevonden van grutto in week 17, kievit week 14, scholekster week 21, tureluur in week 19 en wulp week 15 en 17

Predatie en de predatoren

In tabel 6 staan de door de zoekers aangegeven predatoren van nesten vermeld van de afgelopen 5 jaar. In de tabel staan de oorzaken van predatie, het totaal aantal gepredeerde nesten, het aantal gevonden nesten en het % predatie vermeld. Uit de tabel blijkt o.a. dat van de bekende predatoren de vos, gevolgd door de vogel het meest worden genoemd.

In 2025 lijkt de vos minder actief te zijn geweest t.o.v. de voorgaande jaren. De steenmarter is daarentegen weer vaker genoemd.

Daarnaast valt op dat het percentage gepredeerde nesten elk jaar lijkt af te nemen, van 40,7% in 2021 naar 20,2% in 2025.

Tabel 6

	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Onbekend	107	110	71	156	116	560
Vogels	29	17	12	16	21	95
Vos	35	25	45	17	3	125
Steenmarter	4	2	0	2	8	16
Hermelijn/ wezel	13	0	12	7	4	36
Bunzing	0	0	0	1	1	2
Overige dieren/ mens	0	0	0	1	2*	3
Totaal aantal predatie	188	154	140	200	155	837
Aantal gevonden nesten	462	469	445	626	768	2770
% predatie	40,7	32,8	31,5	31,9	20,2	30,2

* 2 gruttonesten, predatie door mens

Secretariaat:
Oude Rijksweg 381
7954GG Rouveen

Bank NL98TRIO0391113720
KvK 64823458
wvbs@wvbstaphorsterveld.com
www.wvbstaphorsterveld.com



Kauw en vos prederen
Een kievitsnest



In tabel 7 zijn de predatoren per vogel vermeld in 2025. Uit de tabel blijkt dat 80,0% van de predatie een onbekende oorzaak heeft. Dat is logisch, want in de meeste gevallen zijn geen sporen van de predator aanwezig. Van de genoemde predatoren worden de vogel (meestal zwarte kraai) en hermelijn/ wezel het meest genoemd en de vos dit jaar weinig, dit i.t.t. het vorige jaar.

Tabel 7

	Aantal	Vogel	Vos	Bunzing	Steenmarter	Hermelijn/wezel
Grutto	5	2			1	2
Kievit	24	13	3	1	6	1
Scholekster	3	2			1	
Tureluur						
Wulp	5	4				1
Totaal (%)		21 (13,5)	3 (1,9)	1 (1,9)	8	4 (2,6)

Cameraonderzoek

In kader van het steenmarteronderzoek zijn dit jaar 23 camera's geplaatst, 20 bij kievitsnesten, 2 bij wulpennesten en 1 bij een scholeksternest. Het onderzoek vond plaats in het gebied dat wordt omsloten door de Stadsweg, Afschuttingsweg, N377 en Holtrustweg. Uit het onderzoek blijkt dat de steenmarter 3 nesten heeft gepredeert, gevolgd door de vos met 2 nesten en zwarte kraai/ kauw met eveneens 2 nesten. Zie tabel 8.

Tabel 8

	Aantal nesten	Bevindingen			Predator				
		Uit	Predatie	Verlaten	Vos	Steenmarter	Egel	ZW kraai	Kauw
Kievit	20	10	7	3	2	2	1	1	1
Wulp	2	2							
Scholekster	1		1			1			
Totaal	23	12 (52,2%)	8 (34,7%)	3 (13,0%)	2 (25,0%)	3 (37,5%)	1 (12,5%)	1 (12,5%)	1 (12,5%)

Vossenrasters om wulpennesten

In 2025 zijn 39 (53,4%) van de 73 gevonden wulpennesten succesvol gerasterd. Van de 39 nesten zijn 31 nesten uitgekomen, zijn 6 nesten gepredeert, 2 nesten verlaten. (Zie tabel 9)

Naast het individueel rasteren lag 1 wulpennest in een gebiedsraster. Dat nest is eveneens uitgekomen


Tabel 9: het effect van het individueel rasteren van wulpennesten in 2025

Totaal: 73 wulpennesten	
39 gerasterd	31 uit
33 ongerasterd	21 uit
1 gebiedsraster	1 uit

Raster poging	46
Niet geaccepteerd	4
Gepredeerd voor rasteren	3
Gelukke pogingen	39
Uitgekomen	31
Mislukte pogingen	8
Predatie	6
Verlaten	2

Uit tabel 9 blijkt opnieuw dat het rasteren van wulpennesten zinvol is. Van de gerasterde nesten is 81,5% Uitgekomen. Van de niet gerasterde nesten is dat 62,9%.

Grafiek 4: het effect van rasteren vanaf 2019-2025 in percentages



Uit grafiek 4 blijkt dat het percentage gerasterde nesten de laatste 4 jaar ongeveer 50% is. Het percentage uitgekomen nesten is in 2025 weer gelijk aan dat uit de jaren 2019-2021. Het percentage gepredeerde nesten is in de jaren redelijk stabiel. Het percentage verlaten nesten is het laatste jaar 2025 duidelijk lager dan in de voorgaande jaren.

Vossen werend gebiedsraster

Twee gebieden, 1 in de Oosterslag ten noorden van de Conrad weg en 1 in de Zuideindigerslag ten zuiden van de Stadsweg zijn omgeven door een elektrische vossen werende gebiedsraster. Het gebiedsraster in de Oosterslag is 13 percelen groot met een oppervlakte van ongeveer 23 ha en dat in de Zuideindigerslag bestaat uit 1 perceel met een oppervlakte van 6,5 ha. De resultaten van het rasteren staan vermeld in tabel 10. De wulpennesten zijn hier buiten beschouwing gelaten. Uit de tabel blijkt dat het omrasteren van percelen zinvol is. Slechts 1 nest is gepredeerd, door een onbekende predator. Het hoge aantal Kievitsnesten met onbekende uitslag heeft te maken met het feit dat de nesten niet meer waren terug te vinden. Deze nesten kunnen zijn uitgekomen of gepredeerd.

Tabel 10

	nesten							
soort	Bekend resultaat ¹⁾	uit	% uit	gepredaard	% predatie	verlaten	werkzaamheden	onbekend
grutto	17(100%)	17	100	0	0	0	0	0
kievit	33 (100%)	16	48,5	1	3,0	3 (9,0%)	0	13 (39,4%)
scholekster	1 (100%)	1	100	0	0	0	0	0
Tureluur	18 (100%)	18	100	0	0	0	0	0
Totaal	69	52	75,4	1	1,4%	3 (4,3%)	0	13 (18,8)

1) dit zijn de nesten die na het vinden minimaal 1x zijn gecontroleerd. () het % van de gevonden nesten.

Nesten die verloren zijn gegaan tijdens werkzaamheden op het land.

In 2025 zijn 29 (3,8%) van de gevonden nesten verloren gegaan o.g.v. werkzaamheden. Het betrof 8 Kievitsnesten o.g.v. ploegen, 15 nesten o.g.v. beweiden, waarvan 11 Kievits-, 1 wulpen- 3 gruttonesten en 1 scholeksternest o.g.v. gewasbeschermingsmaatregelen. Daarnaast zijn 4 Kievitsnesten en 1 gruttonest verloren gegaan door overige werkzaamheden.

Beschermingsmaatregelen

Om verliezen tijdens werkzaamheden te voorkomen, kunnen beschermingsmaatregelen worden getroffen.

Door de zoekers is aangegeven dat bij 343 nesten 1 of meerdere beschermingsmaatregelen zijn genomen, zie tabel 10. (P.c. deze tabel is niet volledig, aangezien meerdere zoekers de beschermingsmaatregelen niet of onvolledig hebben genoteerd)

Tabel 11 .

	Bemesten	Gewasbescherming	Last minute beheer	Beweiden	Maaien	Ploegen Eggen	Rollen Slepen
Grutto	5	1	18	4	31	4	4
Kievit	35	6	3	26	68	34	34
Scholekster	3	6			1	3	1
Tureluur	1		18		21		
Wulp	9		6	10	31	8	10
Totaal	53	13	45	40	152	49	49

BTS-telling

De BTS-telling wordt ingezet bij de beheermonitoring van weidevogels. De BTS-telling bestaat uit een broedparentelling en een gezinnentelling. De BTS-telling heeft vooral als doel inzicht te krijgen in het broedsucces van de grutto en de wulp. De broedparentelling wordt uitgevoerd vlak voor het uitkomen van de eerste grutto-eieren en de gezinnentelling vlak voor het vliegvlug worden van de eerste gruttokuikens. De BTS is de verhouding tussen de gezinnentelling en broedparentelling. De tellingen zijn verricht op respectievelijk 5 mei en 2 juni.

Gebied Oosterslag; omsloten door Dekkersland, Klaas Kloosterweg, Conrad weg, Rechterensweg



Tabel 12: BTS-tellingen in de Oosterslag

Jaar	Grutto			Wulp		
	Oosterslag			Oosterslag		
	Broedparen	Gezinnen	BTS	Broedparen	Gezinnen	BTS
2021	20	17	85,0	13	9	69,2
2022	24	35	145,8	13	9	69,2
2023	33	15	45,5	12	3	25,0
2024	17,5	14	80,0	12	1	8,3
2025	24	24	100	8,5	6,0	70,6

Er wordt gesteld dat een minimale BTS van 60% bij de grutto en 40% bij de wulp nodig is om de populaties in stand te houden. Voor beide soorten is de BTS-telling in 2025 meer dan voldoende gebleken.

Vliegvlug kuikens


In totaal zijn in 2025, 73 wulpennesten gevonden. Geschat wordt dat hieruit 20-40 kuikens vliegvlug zijn geworden. Per gevonden wulpennest is dat ongeveer 0,4 kuiken per nest. Voor het in stand houden van de wulpenpopulatie is minimaal 0,4 kuiken per nest nodig.

Ontwikkeling wulpenstand in de laatste 5 jaren


Het aantal broedparen van de wulp laat de laatste jaren een teruggang zien, zowel landelijk als in het Staphorsterveld. Om een beeld te krijgen hoe de ontwikkeling zich voortzet zijn het aantal wulpennesten per jaar geteld in delen van de gebieden Oosterslag en Zuideindigerslag in de periode 2020 – 2025. In beide delen is door dezelfde personen geteld.

Uit de grafieken valt te lezen dat het aantal gevonden nesten per jaar verschilt. De trends in de Zuideindigerslag is sterk dalend.


Oosterslag



Zuideindigerslag



Oosterslag + Zuideindigerslag



■ bekend
— Linear (bekend)

Weidevogelreservaat Staatsbosbeheer (SBB)

In het zoekgebied van de vereniging ligt sinds 9 jaar het weidevogelreservaat van Staatsbosbeheer.

Het betreft een gebied van ongeveer 250 ha, ten noordoosten van Hasselt (zie onderstaand kaartje).

In het reservaat heerst gedurende het broedseizoen rust, er wordt niet naar nesten gezocht en er wordt pas gemaaid nadat het broedseizoen is afgelopen. Jaarlijks wordt het reservaat geïventariseerd op het voorkomen van broedvogels volgens het 'broedvogel monitoringsprogramma' (BMP) van SOVON. Voor resultaten: zie grafiek 5.

Uit grafiek 5 blijkt dat het aantal gevonden nesten van de 5 genoemde weidevogels nagenoeg gelijk is aan die uit 2024 en dat de groei in het aantal nesten stagneert.

Kaartje ligging weidevogelreservaat SBB




Discussie
en
conclusie
Het aantal
gevonden

nesten is afhankelijk van o.a. het aantal broedparen, de predatie, de zoeker, de kundigheid van de betreffende zoeker, de intensiteit waarin wordt gezocht, en het gebruik van het land (gras of mais, wisseling in beheer (bijv. plas dras). Daarnaast zijn in 2025 m.b.v. de drone 168 nesten meer gevonden dan in 2024.

Het aantal gevonden nesten laat de laatste 2 jaar een duidelijke stijging zien (tabel 1). Hieruit kan geconcludeerd worden dat het goed gaat met de weidevogels in het Staphorsterveld. Dat geldt voornamelijk voor de grutto en kievit.

Deels kan dit worden verklaard door het toenemende gebruik van de drone voor het opsporen van nesten en door de positieve ontwikkeling van het aantal broedparen in het reservaat van SBB t/m 2024 (grafiek 5, de gegevens van 2025 zijn nog niet voorhanden). Wat dat laatste betreft, er zijn in de Zuideindigerslag, het gebied ten zuiden van de Stadsweg, dit jaar meer gruttonesten gevonden dan in de voorgaande jaren.

Grafiek 5





Na een sterke daling van het aantal gevonden scholeksternesten in 2024, is het aantal gevonden nesten dit jaar weer “op peil”. De drone speelt nauwelijks een rol in het vinden van het aantal scholeksternesten, aangezien die veelal op bouwland liggen en de drone daarover niet of nauwelijks vliegt. Ook speelt weidevogelreservaat van SBB hierin geen rol.

In 2025 is 39% van de nesten “gevonden” door de drone. In 2024 was dat 20,9% en in 2022, 0%. Door de toename in het gebruik van de drone zijn meer grutto- en Kievitsnesten gevonden, maar niet meer nesten van de Tureluur en Wulp. Een verklaring voor de Tureluurnesten kan zijn dat ze diep in het gras liggen en zodoende moeilijk met de drone te vinden zijn. Wulpennesten zijn daarentegen gemakkelijk met de drone te vinden. Dat het aantal gevonden nesten niet is toegenomen, kan wijzen op de achteruitgang van de wulp in ons zoekgebied.

Het percentage gepredeerde nesten neemt elk jaar af (tabel 6). In 2025 waren er opvallend weinig meldingen van predatie door de vos. Ook uit het cameraonderzoek blijkt dat de vos slechts 2 nesten heeft gepredeerd. Dat er dit jaar weinig predatie is geweest door de vos is voor een groot deel te danken aan de WBE. Wel wordt opgemerkt dat een groot deel van de gepredeerde nesten een onbekende predator heeft. Hierin kan de vos een grote rol hebben gespeeld. Het rasteren van wulpennesten is nog steeds zinvol. Helaas kunnen niet alle nesten worden gerasterd. Als oorzaken van het niet rasteren kunnen genoemd worden: Het nest is reeds gepredeerd, het nest ligt op een ongunstige plek, bijvoorbeeld vlak langs de openbare weg, het raster wordt niet door het wulpenpaar geaccepteerd. Ook het omrasteren van percelen heeft een positieve invloed op de predatie. De 2 door de vos gepredeerde Kievitsnesten lagen op het perceel naast het omrasterde perceel in de Zuideindigerslag.

Het percentage uitgekomen nesten zegt weinig over het toekomstperspectief van de weidevogels. De kuikenoverleving is een veel belangrijker factor. De monitoring daarvan is erg lastig en overstijgt vaak de kunde en mogelijkheden van de zoekers. Wel wordt in een deel van het Staphorsterveld (de Oosterslag, waar de meeste grutto- en Tureluurnesten worden gevonden), jaarlijks een BTS-telling gehouden voor grutto en wulp. Uit de telling blijkt dat de BTS van de grutto en wulp dit jaar duidelijk boven de gewenste 60% respectievelijk 40% ligt. Wel wordt opgemerkt dat de BTS voor de wulp minder betrouwbaar is vanwege de grote spreiding in de legdata.

Er wordt geschat dat 0,4 wulpenkukens per wulpenpaar vliegvlug zijn geworden. Bij de schatting wordt voorbijgegaan aan het feit dat van de 73 gevonden nesten, ook 2^e legsels zitten. Daarnaast worden niet alle legsels gevonden. Wanneer dit tegen elkaar wordt weggestreepd dan kan kunnen de 73 gevonden legsels overeenkomen met het aantal wulpenparen in het zoekgebied. Ook kunnen wulpenkukens uit ons zoekgebied naar gebieden buiten het zoekgebied zijn geraakt en vice versa.

Dat het toekomstperspectief van de wulp ongunstig is blijkt ook uit de trend van het aantal gevonden wulpennesten in de afgelopen 5 jaren. Wat betreft de andere vogels kan gesteld worden dat het goed lijkt te gaan met de grutto, en Kievit constant wat betreft de Tureluur en zorgelijk voor wat betreft de scholekster.

Als eindconclusie wordt gesteld dat 2025 een redelijk tot goed weidevogel jaar is geweest.